



Guía de las **Aves** de Marancocha

CONCEPCIÓN - PERÚ



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

SERFOR

Servicio
Nacional
Forestal y
de Fauna
Silvestre



**Siempre
con el pueblo**



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 • 2024

GUÍA DE LAS AVES DE MARANCOCHA - CONCEPCIÓN PERÚ

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO (MIDAGRI)

Ministro

Andrés Rimsky Alencastre Calderón

Viceministro de Políticas Agrarias

Juan Rodo Altamirano Quispe

SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (SERFOR)

Director Ejecutivo (e)

Hilario López Córdova

Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFS) Sierra Central

Administrador Técnico

Luis Castro Narvaez

YUNKAWASI

Directora

Fanny Cornejo Fernández

Elaboración y revisión de contenidos

Antuane Cornejo (Yunkawasi)

Darwin Soto (ATFFS Sierra Central)

Dennis Meza (Yunkawasi)

Enrique Angulo (SERFOR)

Fanny Cornejo (Yunkawasi)

Gerson Ferrer (Yunkawasi)

Jessica Contreras (Yunkawasi)

Jordan Riofano (Yunkawasi)

Luis Castro (SERFOR)

Mónica Alzamora (Yunkawasi)

Rommel Chimaico (ATFFS Sierra Central)

Diseño y diagramación

Margory Luvy

Agradecimientos

Emerson Aquino (CC. Marancocha)

Hector Andrade (CC. Marancocha)

Pablo Tinoco (CC. Marancocha)

Pedro Muñoz (CC. Marancocha)

Primera edición, junio 2022

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2022-05127

Tiraje: 1000 ejemplares

Impreso en A&J Publicidad Gráfica

Av. Bolivia Nro. 180 Int. 118 Lima

© Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor)

Av. Javier Prado Oeste N° 2442, Urb. Orrantía, Magdalena del Mar, Lima - Perú.

Teléfono: (511) 225-9005

www.gob.pe/serfor

informes@serfor.gob.pe

© Yunkawasi

Avenida Mariscal Castilla 582, Santiago de Surco, Lima - Perú

www.yunkawasiperu.org

info@yunkawasiperu.org

Todos los derechos reservados.

Prohibida la reproducción de esta guía por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los autores.

SERFOR & YUNKAWASI. 2022. Guía de las aves de Marancocha Concepción - Perú.

Primera edición. Lima - Perú.

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)

El SERFOR es un organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Su principal función es promover la gestión sostenible de la flora y fauna silvestre del país. Asimismo, define políticas y emite normas y procedimientos para impulsar el desarrollo del sector forestal y de fauna silvestre. Adicionalmente, brinda asistencia técnica especializada y gratuita en manejo forestal y de fauna silvestre y promueve emprendimientos productivos e inversiones vinculadas a plantaciones forestales, ecoturismo, manejo de fauna silvestre y manejo de productos forestales maderables y no maderables.

El SERFOR es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR). Fue creado a través de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre e inició funciones el 26 de julio de 2014.

Adicionalmente, el SERFOR fomenta la investigación científica para generar información técnica actualizada que permita elaborar políticas públicas de impacto; y trabaja con los gobiernos regionales, locales, organizaciones indígenas, campesinas y civiles para asegurar la sostenibilidad de los bosques y otros ecosistemas de vegetación silvestre y el comercio legal de sus recursos. Tiene a su cargo directo 13 Administraciones Técnicas Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) que abarcan 15 departamentos del país. Estas son: Cajamarca, Piura, Lambayeque, Ancash, Lima, Sierra Central, Selva Central, Apurímac, Ica, Arequipa, Moquegua-Tacna, Puno y Cusco; y que a su vez son las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre (ARFFS) en los mencionados departamentos.

Por otro lado, en los departamentos a los que se les ha transferido competencias en materia forestal y de fauna silvestre: Tumbes, La Libertad, Huánuco, Amazonas, Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios, la ARFFS es el gobierno regional. El SERFOR tiene además cuatro Unidades Funcionales de Enlace (UFE) en San Martín, Madre de Dios, Ucayali y Loreto.

Página web: <https://www.gob.pe/serfor>
Correo: informes@serfor.gob.pe



YUNKAWASI

Yunkawasi es una asociación civil que trabaja junto a las comunidades por la conservación de la biodiversidad desde el año 2007. Tiene como objetivos institucionales educar a la población local, fortalecer las capacidades de los tomadores de decisiones y realizar estudios científicos de especies valiosas para la biodiversidad. Actualmente, trabaja en 6 Departamentos del país (Tumbes, Loreto, Piura, Ucayali, Amazonas y Junín), las cuales involucran 3 sitios Ramsar, 2 reservas de biosfera, 2 Hotspot de Biodiversidad, 1 Hope Spot y 15 áreas de conservación, entre ellas Áreas Naturales Protegidas, Áreas de Conservación Regional, Áreas de Conservación Privada y Concesiones para la conservación.

Yunkawasi viene desarrollando el proyecto “Conservación Comunitaria de los Bosques Andinos de San Cristóbal de Pucuta”, en el Departamento de Junín. Este proyecto trabaja de la mano con 09 comunidades campesinas de las provincias de Concepción y Satipo. Estas son: Santa Rosa de Toldopampa, Huánuco, Punco, Talhuis, Maraynioc, La Unión, Santa Rosa de Runatullo, San Cristóbal de Marancocha y Huancamachay, San Antonio, Libertad y Ullimarca.

El presente libro “Guía de Aves de Marancocha Concepción-Perú” es una iniciativa desarrollada por el equipo técnico y de comunicaciones de Yunkawasi. La elaboración de esta publicación se realiza dentro del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el SERFOR y Yunkawasi y en la alianza con la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Sierra Central.

*Página web: <https://www.yunkawasiperu.org>
Correo: info@yunkawasiperu.org*





Presentación

La biodiversidad que existe en los territorios de las comunidades campesinas es imprescindible para el desarrollo de las personas que las habitan. Promover su conocimiento es clave, no solo para aprender a aprovecharla, sino para tomar mejores decisiones sobre la conservación y manejo sostenible de la flora y fauna silvestre. En el Perú existen comunidades campesinas que obtienen beneficios a través del uso sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre, como la observación de aves. Esta actividad ha generado una corriente importante a nivel de muchas comunidades que ven en el turismo de naturaleza una oportunidad económica.

La comunidad campesina San Cristóbal de Marancocha alberga una gran extensión de bosque natural, dentro del cual existe una importante biodiversidad. Destaca la presencia de mamíferos como el maquisapa y diversas especies de aves, que hacen de esta parte de la selva central del Perú un lugar especial y estratégico para el desarrollo del aviturismo. La presente guía de aves es una muestra de la avifauna que habita en esta comunidad y que espera convertirse en un documento de consulta y conocimiento de la biodiversidad con la que conviven los pobladores de Marancocha. Asimismo, busca impulsar el desarrollo de la observación de aves como una práctica para la conservación y aprovechamiento sostenible a favor del bienestar de la comunidad.

*Fanny M. Cornejo | Directora Ejecutiva - Yunkawasi
Luis Castro | Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Sierra Central*



San Cristóbal de Marancocha

Contexto histórico

Los antecedentes más antiguos de la comunidad San Cristóbal de Marancocha se encuentran en el pueblo de San Cristóbal de Ocshatambo, antiguo pueblo de pastores ubicado en la Cordillera de Pucuta. Este pueblo era el más grande de la zona y sus habitantes llegaron a trabajar para la Sociedad Ganadera del Centro y para la Unidad de Producción Runatullo de la ex SAIS Cahuide. A finales de la década de los 70, un grupo de pobladores se empezó a mudar de Ocshatambo a las áreas cercanas al punto de confluencia de los ríos Marancocha y Tulumayo, que a diferencia de Ocshatambo tenía condiciones para realizar actividades agrícolas.

Los primeros pobladores de Marancocha se dedicaron a la agricultura en el valle del Tulumayo sin abandonar la ganadería en las punas de San Cristóbal de Ocshatambo. Finalmente, el 16 de diciembre de 1983 la comunidad es reconocida con el nombre de San Cristóbal de Marancocha, nombre que hace referencia a los dos pueblos hermanados que daban origen a la nueva comunidad, por un lado, San Cristóbal de Ocshatambo y por otro Marancocha. Para el año 1986, la Unidad de Producción Runatullo, decide vender los terrenos del Fundo Runatullo Lote 2 a la nueva comunidad de San Cristóbal de Marancocha, terrenos que desde entonces pertenecen a la comunidad.

El pueblo de San Cristóbal de Ocshatambo quedó fuera de los terrenos comunales de San Cristóbal de Marancocha, además de que se encontraba en franco proceso de despoblamiento. Finalmente, los ciclos de violencia política y el aislamiento geográfico terminaron por despoblar el pueblo de Ocshatambo, algunos de sus últimos pobladores fundaron el pueblo de Unión Condorbamba, que desde entonces serán los dos pueblos integrantes de la comunidad campesina. La comunidad se terminó de consolidar a partir de la inmigración de personas provenientes de los distritos de Mariscal Castilla y Cochabamba, y la emigración de un grupo de familias fundadoras que pertenecían a la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (AEMINPU).







Ubicación y características ecológicas

El área de la comunidad campesina San Cristóbal de Marancocha, se ubica en el distrito de Mariscal Castilla, provincia de Concepción, departamento de Junín. Se encuentra dentro de la ecorregión de las Yungas, con un área aproximada de 14 290 hectáreas. La zona de estudio tiene una altura desde los 1350 hasta los 3500 m.s.n.m. donde encontramos a los pueblos de Marancocha y Unión Condorbamba. Presenta bosque primario, bosque secundario y zonas de cultivos. El bosque primario posee árboles que llegan a medir hasta 25 m en zonas muy alejadas y de difícil acceso; el bosque secundario se encuentra cercano a los cultivos y a los dos pueblos que conforman la comunidad; finalmente, en las zonas de cultivos se siembra maracuyá, granadilla, café, palta, frijol, zapallo, yuca y maíz.



MAPA DE UBICACIÓN

San Cristóbal de Marancocha



Generalidades

El Perú es considerado uno de los países megadiversos, debido a la extraordinaria diversidad de ecosistemas, zonas de vida y climas que alberga, permitiendo la existencia de diversas especies de animales y plantas. Por ejemplo, en nuestro país podemos encontrar más de 1800 especies de aves, lo que permite ubicarnos entre uno de los lugares preferidos en el mundo por los observadores de aves.

La ubicación geográfica de nuestro país es un privilegio, dado que en una ruta de menos de tres horas, se puede pasar de un ecosistema a otro, debido a la presencia de la cordillera de Los Andes, por ejemplo en Junín, el gradiente altitudinal pasa de los 1500 a 5000 m.s.n.m. pasando de la selva tropical a los nevados perpetuos y lagunas altoandinas, pudiendo apreciar en su recorrido diversas especies de aves que van desde tangaras, colibríes, pavas, gorriónes, águilas entre otros.

Entre las características básicas que es necesario mencionar de las aves, es que todas tienen plumas, se reproducen por huevos, sus extremidades anteriores se han modificado en alas, pero el vuelo, no es una característica única de ellas y que todas las aves poseen, por ejemplo los pingüinos son aves que no vuelan, y los murciélagos son mamíferos que pueden volar también. Siendo el Perú uno de los países con mayor diversidad de aves es importante seguir promoviendo su conocimiento y aprender un poco más de las aves de nuestra comunidad, en esta guía hay una muestra de las aves de la comunidad de San Cristóbal de Marancocha.



LC

Foto: Mac Quintanilla

Carpinterito DE LAFRESNAYE (*Picumnus lafresnaye*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

HASTA 1200 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO

DESCRIPCIÓN:

Este carpintero tiene un color verde oscuro ligeramente con franjas oscuras. Ambos sexos con franjas uniformes por debajo. La frente del macho con pintas rojas o amarillo dorado.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de termitas y otros artrópodos pequeños.



TAMAÑO:
09 - 10 cm

DATOS CURIOSOS:

Carpintero bastante común en tierras bajas en el este de la Amazonía. Parece preferir bordes, claros de bosque y bosque secundario.

Picidae

48



La presente guía es un material de fácil uso. En cada lámina tenemos textos que describen a la especie señalada. En la parte superior se indica la categoría en la que la especie se encuentra en la Lista Roja de la UICN, indicando el estado de conservación de la misma: En peligro crítico (CR), En peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi amenazada (NT), Preocupación menor (LC). Y según CITES, el cual es un acuerdo internacional que controla el comercio internacional de especies de animales y plantas silvestres. Apéndice I: Son las especies de fauna y de flora con mayor grado de peligro. Apéndice II: Son las especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo si no se controla su comercio. Apéndice III: Son las especies que necesitan la cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal de las mismas. Ninguna de las especies de esta guía se encuentra catalogada dentro del DS 004-2014-MINAGRI.

Seguidamente, se presenta el nombre común y nombre científico.

Se presenta el mapa del Perú, en el cual está sombreada el área donde se distribuye la especie en el país. Se indica el rango altitudinal (altura) en metros; así como, el tipo de región en la que se encuentra. Asimismo, se indica si la especie es Residente, Migratoria o Endémica (Ojo: en el glosario se coloca los conceptos de estas palabras).

En la descripción de la especie se indica algunas características morfológicas, datos de la dieta de la especie e información particular que debe ser considerada al momento de su identificación.

En la parte final de la guía se pone a disposición una lista de las especies ordenadas por su nombre científico, donde se podrá hacer un check si llegas a observar al ave e iniciarse en la práctica de observación de aves en su comunidad.

También se incluye un glosario, donde podrás aprender sobre términos usados en esta guía para su mejor entendimiento.

¿Cómo usar la guía?





Diversidad

DE LAS AVES DE MARANCOCHA

86

ESPECIES
OBSERVADAS

28

FAMILIAS
DE ESPECIES

CATEGORÍA DE AMENAZA:

VU

VULNERABLE

PERDIZ GRIS
(*Tinamus tao*)

TANGARA DE GORRO BLANCO
(*Sericossypha albocristata*)

MOSQUERO DE CEJA LIMÓN
(*Conopias cinchoneti*)

NT

CASI
AMENAZADA

ÁGUILA SOLITARIA
(*Buteogallus solitarius*)

ESPECIES EN LA LISTA CITES

AGUILUCHO CAMINERO - (*Rupornis magnirostris*)
ELANIO TIJERETA - (*Elanoides forficatus*)
ÁGUILA SOLITARIA - (*Buteogallus solitarius*)
AGUILUCHO DE ALA ANCHA - (*Buteo platypterus*)
GALLITO DE LAS ROCAS ANDINO - (*Rupicola peruvianus*)
ESTRELLITA DE VIENTRE BLANCO - (*Chaetocercus mulsant*)
COLIBRÍ COLA DE RAQUETA - (*Oreatus underwoodii*)
BRILLANTE DE PECHO ANTEADO - (*Heliodoxa rubinoides*)

II

FAMILIA

| **Accipitridae**
(4 especies)

| **Anatidae**
(1 especie)

| **Bucconidae**
(1 especie)

| **Cardinalidae**
(1 especie)

| **Cathartidae**
(1 especie)

| **Cinclidae**
(1 especie)

| **Columbidae**
(4 especies)

| **Furnariidae**
(15 especie)

| **Icteridae**
(2 especies)

| **Momotidae**
(1 especie)

| **Parulidae**
(4 especies)

| **Passerellidae**
(3 especies)

| **Phalacrocoracidae**
(1 especie)

| **Picidae**
(4 especies)

| **Ramphastide**
(2 especies)

| **Corvidae**
(2 especies)

| **Cotingidae**
(1 especie)

| **Cracidae**
(2 especies)

| **Cuculidae**
(1 especie)

| **Donacobiidae**
(1 especie)

| **Fringillidae**
(1 especie)

| **Thraupidae**
(20 especies)

| **Tinamidae**
(1 especie)

| **Tityridae**
(1 especie)

| **Trochilidae**
(6 especies)

| **Troglodytidae**
(1 especie)

| **Trogonidae**
(1 especie)

| **Tyrannidae**
(12 especies)




Perdiz

GRIS

(*Tinamus tao*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

HASTA 1400 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO MONTANO

DESCRIPCIÓN:

Ave bastante escurridiza de tamaño grande. Detrás del ojo y por el cuello presenta plumas manchados de blanco y negro, y una banda negruzca baja hasta los lados del cuello, en general todo el cuerpo es de color grisáceo.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de insectos, pequeños vertebrados, moluscos, frutos y semillas.



TAMAÑO:
43 - 46 cm

DATOS CURIOSOS:


Este perdiz tiene un canto generalmente crepuscular y emitido a intervalos largos.



Pato

DE LOS TORRENTES
(*Merganetta armata*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

900 A 3500 m s. n. m.

RÍOS TORRENTOSOS

DESCRIPCIÓN:

Esta ave es una especie experta nadadora. El macho es blanco con ralladuras blancas y negras en el pecho y vientre. Presenta una línea que cruza el ojo y termina en el cuello. La hembra es de garganta y vientre rojizo y más pequeña que el macho.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de peces y crustáceos que obtiene buceando.



TAMAÑO:
38 - 42 cm


DATOS CURIOSOS:

Cada pareja mantiene un territorio de aproximadamente dos kilómetros a lo largo del río.

Pava

ALA DE HOZ
(*Chamaepetes goudotii*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

900 a 2200 m s. n. m.

ÁRBOL DE BOSQUE

DESCRIPCIÓN:

Pava inconfundible por la piel facial azul intenso, vientre café rojizo y patas rojas. Si queremos escuchar cantar a esta pava tendríamos que estar atentos antes del amanecer.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de frutos en la parte alta y media del bosque.



TAMAÑO:
61 - 63.5 cm

DATOS CURIOSOS:

En vuelos cortos sus alas causan un sonido característico. Cuando se alimentan lo hacen en parejas o grupos.



Chachalaca

JASPEADA

(*Ortalis guttata*)

📍 RANGO DE DISTRIBUCIÓN



🎯 RESIDENTE


🌿 HASTA 1700 m s. n. m.

🌳 BOSQUE RIBEREÑO

🦜 DESCRIPCIÓN:

Pava de medio kilo o un poco más, fácilmente reconocible por el canto estruendoso "¡cha - cha LAH-Kah!". Tiene el pecho y cuello como si tuviera puntos (moteado), las patas son rosadas y la cola café rojiza.

🍎 ALIMENTACIÓN: Come fruto, también hojas, brotes y algunos frutos de palmeras.



TAMAÑO:
49.5 - 52 cm

“ DATOS CURIOSOS:

Le gusta los frutos de la Cecropia. Son aves muy asustadizas, se espantan hasta con el más mínimo movimiento.



Paloma

DOMÉSTICA

(*Columba livia*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE (NO ES NATIVA)


A LO LARGO DE TODO EL TERRITORIO

ZONAS URBANAS Y RURALES

DESCRIPCIÓN:

Paloma común con plumaje variable, hay de colores grises, blancos, marrones y combinaciones. Usualmente se la escucha cantar cuando el macho está pasado frente a la hembra realizando movimientos de cortejo.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de granos, pequeñas frutas, moluscos y otros invertebrados.



TAMAÑO:
33 - 35.5 cm

DATOS CURIOSOS:


Tiene la capacidad de volver a su nido desde lugares muy lejanos, por ello antiguamente la usaban para enviar mensajes.



Paloma

PERDIZ DE GARGANTA BLANCA
(*Zentrygon frenata*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

1000 A 3300 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO MONTANO

DESCRIPCIÓN:

Paloma de tamaño grande por ello le dicen "paloma perdiz". Plumaje gris marrón apagado, presenta una línea delgada negra en la mejilla y corona gris, parche en la mejilla de color rojizo. Iris de color amarillo pálido y pico oscuro.

ALIMENTACIÓN: Su alimentación es desconocida, pero se presume que se alimenta de semillas, frutos e insectos.



TAMAÑO:
29.5 - 32 cm

DATOS CURIOSOS:

Como se ve es una paloma que puede estar a altas alturas.

Paloma

DE NUCA BLANCA

(*Patagioenas fasciata*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

1000 A 3600 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO MONTANO

DESCRIPCIÓN:

Paloma con plumaje iridiscente en el cuello, visualmente como las escamas de un pez. Presenta un delgado collar blanco en la nuca y las partes inferiores son de color marrón rojizo. Cuando canta se puede confundir con el sonido de un búho.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de bellotas, frutos pequeños, flores y brotes foliares.



TAMAÑO:
35.5 - 37 cm

DATOS CURIOSOS:


Única paloma arbórea de altas elevaciones. Puede formar bandadas de hasta 50 individuos y todos avanzan de árbol en árbol.



Paloma

DE PUNTAS BLANCAS
(*Leptotila verreauxi*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


HASTA 2700 m s. n. m.

SENDERO O BORDE DE CAMINO

DESCRIPCIÓN:

En Brasil lo conocen como PU - PU por el canto melancólico. Tiene el plumaje pardo, pecho claro y cuando vuela se ve una coloración rojiza debajo del ala. Es también muy asustadizo y escapa al mínimo sonido.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de granos, semillas, frutas y verduras.



TAMAÑO:
26.5 - 28 cm

DATOS CURIOSOS:

Arroja los granos al suelo para recogerlos después y uno de sus depredadores es la *Boa constrictor*.

Cuco ARDILLA

(*Piaya cayana*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


HASTA 2800 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO

DESCRIPCIÓN:

Este cuco ardilla presenta una cola escalonada y cuando se la observa de frente cada pluma de la cola tiene el borde blanco. Su cabeza es castaño rufo, vientre y un poco del pecho gris. Presenta un iris rojo y pico amarillento.

ALIMENTACIÓN: Insectos grandes como orugas, escarabajos, chicharras y arañas. Del follaje, se alimenta de bayas.



TAMAÑO:
50.5 - 46 cm

DATOS CURIOSOS:

Se ha visto que el macho le da un insecto a la hembra como cortejo y posterior cópula haciendo el abrazo nupcial.




Cormorán

NEOTROPICAL

(*Phalacrocorax brasilianus*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


3200 A 4200 m s. n. m.

LAGOS, RÍOS O MARISMAS

DESCRIPCIÓN:

Este cormorán neotropical tiene el plumaje negruzco y a veces presenta una iridiscencia en el plumaje de color verde o azul, su canto son gruñidos parecidos a los lobos de mar.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta principalmente de peces, anfibios y crustáceos.



TAMAÑO:
58 - 73 cm

DATOS CURIOSOS:

Esta especie anida en los árboles y a los 3 meses sus pichones son independientes. Cuando está en el mar está cerca de las costas.



Gallinazo

DE CABEZA ROJA

(Cathartes aura)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

HASTA 2200 m s. n. m.

AMAZONÍA

DESCRIPCIÓN:

Gallinazo negro a la distancia, pero su plumaje es marrón, cabeza roja sin plumas, pico corto ganchudo y de color marfil. No posee siringe, es decir no produce cantos, sino silbidos. Sus fosas nasales están perforadas mirándose como un hueco.

ALIMENTACIÓN: Limpia ecosistemas, se alimenta de carroña, por ende se evitan plagas y enfermedades.



TAMAÑO:

60 - 70

ENVERGADURA ALAR:

133 - 160 cm

DATOS CURIOSOS:

Anida en cuevas, huecos de árboles o matorrales y pueden vivir hasta 16 años en silvestría y en cautiverio hasta más de 30 años.



Elanio

TIJERETA

(*Elanoides forficatus*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

HASTA 2450 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO

DESCRIPCIÓN:

Esta es una rapaz elegante con coloración blanca y negra. Se caracteriza por presentar una notoria cola dividida en 2 como una tijera. Las hembras de esta especie también son más grandes que el macho.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de insectos como libélulas, también captura vertebrados pequeños como ranas y serpientes arbor colas.



TAMAÑO:
52 - 62 cm
ENVERGADURA:
119 - 136 cm

DATOS CURIOSOS:

Son aves que pueden pasar más el tiempo volando que perchedas en las ramas de un árbol.



Aguilucho CAMINERO

(*Rupornis magnirostris*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

1600 a 2600 m s. n. m.

BOSQUE Y RÍO

DESCRIPCIÓN:

Rapaz con iris claro, pico curvo oscuro con cera amarilla; la cabeza y la parte superior de las alas son de color gris en el adulto. Barras en abdomen más anaranjado. Los machos son más pequeños que las hembras.

ALIMENTACIÓN: Consume insectos, murciélagos, mamíferos pequeños, aves y lagartijas.



TAMAÑO:
34 - 40 cm
ENVERGADURA:
68 - 92 cm

DATOS CURIOSOS:


Las hembras tienen ambos ovarios desarrollados, en lugar de solo el izquierdo como en otras aves.

Aguilucho

DE ALA ANCHA

(*Buteo platypterus*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



MIGRANTE BOREAL

HASTA 3000 m s. n. m.

BOSQUE Y ZONA URBANA

DESCRIPCIÓN:

Aguilucho con iris oscuro, cera opaca y no tiene el tono rojizo en las plumas del ala. El dorso es marrón oscuro, con intensidad en la espalda y en la punta de las alas. La garganta es blanca y los lados de la cabeza y la nuca con manchas blancas y castañas.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de roedores, anfibios y reptiles.



TAMAÑO:

37 - 42 cm

ENVERGADURA:

82 - 92 cm

DATOS CURIOSOS:

Su nombre científico significa "gavilán de alas anchas" y deriva del término buteo = (gavilán) y de la raíces griegas *platus*: ancho y *pteron*: ala.

Águila SOLITARIA

(*Buteogallus solitarius*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


700 A 2100 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO MONTANO

DESCRIPCIÓN:

Como su nombre lo indica, suelen desplazarse en solitario volando en amplios círculos. No se conoce su dieta y comportamiento. Uniformemente de color gris oscuro con algunas barras grises, parte posterior del pico (ceras) y las patas son amarillas.

ALIMENTACIÓN: Desconocido.



TAMAÑO:
66 - 75 cm
ENVERGADURA:
157 - 180 cm

DATOS CURIOSOS:

Se presume que sus territorios son de grandes extensiones por los desplazamientos bastante amplios.



Quetzal

DE CABEZA DORADA
(*Pharomachrus auriceps*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

1200 A 3000 m s. n. m.

SELVA MONTAÑOSA HÚMEDA

DESCRIPCIÓN:

Quetzal con vistosos colores, cabeza de color dorado, pico amarillo en machos y gris parduzco en hembras. Pecho de color rojo naranja brillante, cola siempre oscura en la parte interna del ave y tiene el iris marrón.

ALIMENTACIÓN: Se alimentan de insectos y ranas, pero mayormente de frutas, prefiriendo las Lauraceas.



TAMAÑO:
33.5 cm

DATOS CURIOSOS:

La hembra pone dos huevos de una coloración azul pálida, luego hembra y macho los empollan durante 18 días.

Relojero

ANDINO

(*Momotus aequatorialis*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


1000 A 2400 m s. n. m.

BOSQUE HÚMIDO MONTANO

DESCRIPCIÓN:

Este relojero presenta una cabeza voluminosa, posee una banda azul clara que rodea la coronilla negra volviéndose morada en la nuca, tiene ojos rojos y patas grises. Su cola es larga con forma de raqueta en las puntas totalmente azul.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de insectos, escarabajos, orugas, larvas de polilla sin pelo, hormigas, mamíferos pequeños, caracoles, ranas y semillas.



TAMAÑO:
46 - 48 cm


DATOS CURIOSOS:

La incubación comienza con el primer huevo, de manera que los polluelos nacen en diferentes días. La hembra por lo general incuba durante la noche y por el día se turna con el macho.

Buco

LISTADO DE NEGRO
(*Malacoptila fulvogularis*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


1000 A 2400 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO MONTANO

DESCRIPCIÓN:

Buco mediano con pico todo oscuro, ojos rojos, cabeza pardo negruzco con finas líneas blanco cremas. La parte superior del cuerpo es pardo con estrías tenues, presenta bigotes blancuzcos y su cola es larga y graduada de color café.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de grandes invertebrados siguiendo a grupos de hormigas.



TAMAÑO:
18.5 - 19 cm

DATOS CURIOSOS:

Puede permanecer inmóvil por largos periodos de tiempo en las ramas, hasta que identifica su presa y lo captura. También conforma bandadas mixtas para alimentarse.




Carpintero

PARDO

(*Dryobates fumigatus*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

1200 A 2900 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO MONTANO

DESCRIPCIÓN:

Notoriamente uniforme y marrón oscuro, con los lados de la cara claros y resaltantes. El macho adulto tiene las plumas de la nuca grises con la punta roja. La hembra adulta las plumas con la punta marrón.

ALIMENTACIÓN: Su dieta consta de escarabajos y larvas.



TAMAÑO:
15.5 - 16 cm


DATOS CURIOSOS:

Presente en la vertiente oeste y este de los Andes, así como también en cadenas montañosas aisladas.

Carpintero

DE VIENTRE ROJO
(*Campephilus haematogaster*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


900 A 2300 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO MONTANO

DESCRIPCIÓN:

Es el único carpintero grande con pecho, vientre, cuello y rabadilla rojos. Presenta un pico largo casi recto de color gris-negro. Tiene el iris de color café rojizo y patas café pardusco. La hembra difiere del macho por la franja ante de las mejillas se prolonga hasta los lados del cuello.

ALIMENTACIÓN: En su dieta se han registrado escarabajos grandes y larvas de escarabajos xilófagos.




TAMAÑO:
33 - 34 cm

DATOS CURIOSOS:

Sus técnicas de captura de alimento más empleadas son el picoteo firme y contundente y la búsqueda de cavidades.

Carpinterito DE LAFRESNAYE (*Picumnus lafresnayi*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


HASTA 1200 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO

DESCRIPCIÓN:

Este carpintero tiene un color verde oscuro ligeramente con franjas oscuras. Ambos sexos con franjas uniformes por debajo. La frente del macho con pintas rojas o amarillo dorado.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de termitas y otros artrópodos pequeños.



TAMAÑO:
09 - 10 cm

DATOS CURIOSOS:

Carpintero bastante común en tierras bajas en el este de la Amazonía. Parece preferir bordes, claros de bosque y bosque secundario.



Carpintero LINEADO

(*Dryocopus lineatus*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


HASTA 1500 m s. n. m.

BOSQUE

DESCRIPCIÓN:

Los adultos son negros en sus partes superiores con un penacho de plumas rojo en la cabeza y franja blanquecina que va de la base del pico por el cuello hasta el hombro. Su vientre y rabadilla presentan franjas negras.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de insectos, perforando troncos y ramas podridas para encontrar hormigas, escarabajos y sus larvas.



TAMAÑO:
31.5 - 36 cm

DATOS CURIOSOS:


En las ciudades de Colombia aprovecha las lámparas para picotearlas amplificando el sonido de su "tamborileo" para marcar su territorio.



Tucancillo

DE ESMERALDA SUREÑO
(*Aulacorhynchus albivitta*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


1600 A 2500 m s. n. m.

SELVA HÚMEDA

DESCRIPCIÓN:

Este tucanillo tiene el pico principalmente negro y con una ancha área amarilla en la parte superior del pico y la base vertical delineada de blanco. Su cuerpo es verde brillante y más pálido por debajo.

ALIMENTACIÓN: Su alimentación consiste en frutas y sus semillas. También complementa con insectos, lagartijas y huevos de otras aves.



TAMAÑO:
29.5 - 31.5 cm

DATOS CURIOSOS:


Tucanillo poco común en bosque montano húmedo.

Tucancillo

DE FRANJA CELESTE

(*Aulacorhynchus coeruleicinctis*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


1300 A 2500 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO MONTANO

DESCRIPCIÓN:

Su nombre es debido a la peculiar franja horizontal de un color azul celeste bastante visible en el vientre y debajo de los ojos. Pico gris con punta crema y sin borde blanco en su base; notar también su franja roja en la rabadilla, franja azul claro en el pecho y verdosas. Iris claro, pero a veces oscuro.

ALIMENTACIÓN: Su alimentación consiste en frutas y sus semillas. También complementa con insectos, lagartijas y huevos de otras aves.



TAMAÑO:
40.5 cm

DATOS CURIOSOS:

En cuestión a su llamada es una serie de ladridos ásperos y cascabeleados.



Picogrueso DORADO

(*Pheucticus chrysogaster*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


HASTA 3500 m s. n. m.

BOSQUE SECO Y VALLE

DESCRIPCIÓN:

Esta ave hace honor a su nombre por el pico robusto con la mandíbula superior negra y la inferior gris azulado; tiene iris café oscuro y patas grises. Su espalda es negra, su rabadilla amarilla y su cola es negra. La hembra difiere en el macho por la coronilla amarillo pálido fuertemente estriada (rayas).

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de semillas, frutos tipo baya e insectos.



TAMAÑO:
20.5 - 21.5 cm

DATOS CURIOSOS:

Su nombre científico deriva de Pheuktikos = tímido y de Chrysogaster = vientre dorado, es decir significa tímido de vientre dorado.



Piranga BERMEJA

(*Piranga flava*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

400 A 2700 m s. n. m.

MATORRAL MONTANO

DESCRIPCIÓN:

El macho adulto de la piranga bermeja es rojo opaco y la hembra amarillo verdoso. La hembra tiene el cuerpo oliva amarillento y el dorso con tinte más dorado en la frente. Por debajo también es amarillo oliva.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de insectos como escarabajos, orugas, mariposas y grillos. También consume frutos tipo baya, semillas y néctar.



TAMAÑO:
18 cm

DATOS CURIOSOS:


A esta avecita le gusta solo interactuar con individuos de la misma especie, por lo que no se les ve con otras alimentándose.



Mirlo

ACUÁTICO
DE GORRO BLANCO
(*Cinclus leucocephalus*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

1500 A 3100 m s. n. m.

RÍO Y ARROYO

DESCRIPCIÓN:

Fácilmente reconocible por la forma regordeta, con capucha y el pecho blanco. Presenta una pequeña máscara negra y un collar nual. Existen 2 subespecies, el *leucocephalus* tiene espalda y abdomen oscuros y el *leuconotus* tiene blanco y en la espalda y abdomen blanco.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de artrópodos. También de pequeños vertebrados como escarabajos.



TAMAÑO:
15 - 16 cm

DATOS CURIOSOS:

Su nido es una estructura globosa y tiene una entrada por un costado. Está se encuentra en la huecos y grietas de una pared en el borde del río.




Urraca

VIOLÁCEA

(*Cyanocorax violaceus*)

📍 RANGO DE DISTRIBUCIÓN



🎯 RESIDENTE

📏 900 A 1400 m s. n. m.

🌳 AMAZONÍA

🐦 DESCRIPCIÓN:

Esta urraca violácea tiene la cabeza, garganta y alto de pecho negro. Franja de la nuca color blanco lechoso y azul violeta opaco en el resto del plumaje. Vientre y rabadilla de color pálido grisáceo.

🍷 **ALIMENTACIÓN:** Se alimenta de insectos y frutos.



TAMAÑO:
36 - 37 cm

💡 DATOS CURIOSOS:

Algunas veces se les puede encontrar formando bandadas con oropéndolas y caciques.




Urraca

VERDE

(*Cyanocorax yncas*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


1100 A 2400 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO MONTANO

DESCRIPCIÓN:

Esta urraca tiene el plumaje verde y amarillo, con corona clara y garganta negra, es inconfundible. Iris amarillo pálido y cola oscura. Puede habitar en áreas intervenidas por el hombre como los cultivos de café y cacao.

ALIMENTACIÓN: Su dieta consiste en insectos, frutas, huevos de lagarto y en algunas ocasiones polluelos.



TAMAÑO:
30 - 33 cm


DATOS CURIOSOS:

Se ha visto que algunos individuos usan palos como herramienta para extraer insectos de la corteza de los árboles.

Gallito

DE LAS ROCAS ANDINO
(*Rupicola peruvianus*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


500 a 2300 m s. n. m.

ALTO Y HÚMEDO BOSQUE DE NEBLINA

DESCRIPCIÓN:

Presenta una diferencia marcada entre macho y hembra. El macho posee un plumaje muy colorido de rojo intenso. Las hembras a diferencia son de color opaco dominado por tonos de marrón. Los juveniles son parecidos a la hembra.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta sobre todo de frutos.



TAMAÑO:
31 - 33 cm

DATOS CURIOSOS:

A menudo proclamado como el ave nacional del Perú, su nombre científico significa "ave de las rocas peruanas" y en un tiempo sufrió de tráfico ilegal de fauna silvestre.

Donacobio

(*Donacobius atricapilla*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


A LO LARGO DE TODO EL TERRITORIO

HUMEDALES - LAGOS - MEANDROS

DESCRIPCIÓN:

Ave esbelta de cola larga con bordes blanco, iris amarillo brillante. Por encima es café chocolate, coronilla y los lados de la cabeza negros. Vientre y rabadilla color crema, juvenil con angosta línea blanca por encima del ojo (superciliar).

ALIMENTACIÓN: Se alimenta principalmente de invertebrados que captura en la superficie de pastos y algunas veces captura a insectos en vuelo.



TAMAÑO:
22 - 23 cm

DATOS CURIOSOS:

Las parejas de esta especie se unen de por vida. Predominan en la vegetación acuática.



Jilguero

ENCAPUCHADO

(*Spinus magellanicus*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


HASTA 4200 m s. n. m.

JARDINES - PARQUES - BOSQUES

DESCRIPCIÓN:

El macho es verdoso encima y amarillillo por debajo, cabeza con capucha negra. La hembra no tiene capucha, su cabeza es gris, dorso pálido y por debajo más verdosa.

ALIMENTACIÓN: Su dieta es en base a todo tipo de granos, pero en época de cría busca insectos como los pulgones.



TAMAÑO:
14 cm

DATOS CURIOSOS:

La hembra sin ayuda del macho construye el nido en 7 o 9 días. Jilguero ampliamente distribuido y común en nuestro país.




Cola Espina

DE AZARA

(*Synallaxis azarae*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


1250 A 3100 m s. n. m.

SOTOBOSQUE DE MONTAÑA

DESCRIPCIÓN:

Su cara, pecho, vientre y rabadilla pueden variar de gris a blanquecino. Tienen corona y alas predominantemente rufas. Cola usualmente casi toda rufa.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta principalmente de artrópodos como algunas larvas de polillas y en menor proporción de semillas.



TAMAÑO:
15 - 17 cm

DATOS CURIOSOS:

Se encuentra principalmente en bordes de los bosques húmedos de neblina y matorrales densos.



Trepatroncos OLIVÁCEO

(*Sittasomus griseicapillus*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

HASTA 1700 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO DE LA AMAZONÍA

DESCRIPCIÓN:

La cabeza, la corona, la garganta y la parte superior del dorso son de color verde oliváceo. Cola de color castaño rojizo el pecho y el vientre son grises. Se caracteriza por carecer de estrías o barras.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de musgo, líquenes y hojas muertas, artrópodos y ocasionalmente de frutos y otra materia vegetal.



TAMAÑO:
16 - 17 cm

DATOS CURIOSOS:

En Brasil se ha reportado que comían 64% de larvas y adultos de escarabajo y 24% de cucarachas y cápsulas de sus huevos y lo resto de moscas, hormigas y termitas.



Limpia follaje

DE LOMO RUFO

(*Philydor erythrocerum*)

📍 RANGO DE DISTRIBUCIÓN



🎯 RESIDENTE

📏 HASTA 1700 m s. n. m.


🌳 BOSQUE ALTO

🦋 DESCRIPCIÓN:

Limpia follaje pequeño y de colores opacos. Presenta una cola que se diferencia del cuerpo. Su cabeza y alas son de color grisáceo. Tiene anillo ocular blanquecino. El dorso es pardo oliva y la cola rufa.

🦋 ALIMENTACIÓN:

Se alimenta principalmente de artrópodos con algunas larvas de polillas y en menor proporción de semillas.



TAMAÑO:
16.5 cm

💡 DATOS CURIOSOS:

Al limpia follaje geográficamente la encontramos en varios lugares. Desde llanuras, tierra firme hasta el pie de los Andes y en cordilleras bajas.



Pico-Lezna RAYADO

(*Xenops rutilans*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


600 A 2100 m s. n. m.

BOSQUE MONTANO HÚMEDO

DESCRIPCIÓN:

Presenta iris café a café oscuro, patas gris oscuro y pico corto con mandíbula superior café oscuro y mandíbula inferior curvada de color blancuzco a grisáceo.

ALIMENTACIÓN: Principalmente de artrópodos como larvas de escarabajos.



TAMAÑO:
11.5 - 12.5 cm

DATOS CURIOSOS:


Su nombre *Xenops* proviene de las raíces griegas *xenos* = extraño y *ops* = rostro. El epíteto *rutilans* proviene del latín *rutilus* = rojo, castaño.



Cola Púa MOTEADA

(*Premnoplex brunnescens*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


850 A 2500 m s. n. m.

BOSQUE MONTANO

DESCRIPCIÓN:

Ambos sexos son similares y de color oscuro en general. Iris café, patas café grisáceas y pico con mandíbula superior negra e inferior grisáceo. Cola rufa larga con garganta y superciliar clara.

ALIMENTACIÓN: Su dieta se compone de artrópodos, entre los cuales hay escarabajos, arañas, cucarachas y sus huevos, hormigas, etc.



TAMAÑO:
13.5 cm

DATOS CURIOSOS:

Se la encuentra con otras especies en bandadas y esta especie no usa la cola como soporte.



Dropéndola

VERDE OSCURO

(Psarocolius atrovirens)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

 **800 A 2600 m s. n. m.**

 **BOSQUE HÚMEDO MONTANO**

DESCRIPCIÓN:

Oropéndola uniforme verde oscuro. Pico de color amarillento pálido, cola amarilla con par de plumas verde oscuro en el medio. Además, por lo general carece de la frente amarilla, pero algunos la tienen.

 **ALIMENTACIÓN:** Desconocido.



TAMAÑO:
Macho 41 - 43 cm
Hembra 33 cm

DATOS CURIOSOS:

Bastante común en la vertiente este de los Andes del centro y el sur.

Dropéndola

DE DORSO BERMEJO

(*Psarocolius angustifrons*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

HASTA 2000 m s. n. m.

BOSQUE DENSO Y DISPERSO

DESCRIPCIÓN:

Predominantemente marrón opaco con rabadilla rufa y un tono verde olivo en la cabeza. La frente y picos son amarillentos. El macho es más grande que la hembra.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de frutos y néctar.



TAMAÑO:
44 - 48 cm

DATOS CURIOSOS:

Es un ave colonial que usualmente forma grupos de 5 a 10 nidos y su apareamiento es promiscuo.



Candelita

DE GARGANTA PLOMIZA
(*Myioborus miniatus*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

700 A 2600 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO

DESCRIPCIÓN:

Tiene la parte superior del pecho amarilla u ocrácea. Pico de base ancha y su garganta negruzca contrasta con el pecho y abdomen de color amarillo anaranjado. Los adultos presentan el centro de la coronilla rufo oscuro. Cola es negra con algunas puntas de color blanco y por debajo blanco.

ALIMENTACIÓN: Insectos que atrapa en vuelo. También busca sobre el follaje o las cortezas de árboles.



TAMAÑO:
13.5 cm

DATOS CURIOSOS:

Es activo y constantemente abre la cola en abanico y entrea-bre las alas para espantar insectos y cazarlos en vuelo.




Chipe

DE COLLAR

(*Cardellina canadensis*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



MIGRANTE BOREAL


 700 A 2600 m s. n. m.

 SOTOBOSQUE DENSO Y HÚMEDO

DESCRIPCIÓN:

El chipe de collar tiene el vientre amarillo, el dorso es gris azulado y las patas rosadas. Observar el notorio anillo periocular amarillo, el “collar” y la frente oscura que no se ve mucho en hembras y juveniles.

 **ALIMENTACIÓN:** Se alimenta principalmente de insectos, sobre la vegetación, en el suelo o en vuelo.



TAMAÑO:
13 cm

DATOS CURIOSOS:


Anida en Norteamérica e inverna principalmente en el norte de Sudamérica.



Reinita

DE CABEZA LISTADA
(*Basileuterus tristriatus*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

1050 A 2200 m s. n. m.

BOSQUE MONTANO HÚMEDO

DESCRIPCIÓN:

Presenta una línea negra curva que va por detrás y debajo del ojo. Los adultos son verde oliva por el dorso y alas. Presenta listas negras en los lados de la coronilla. El pico pálido y patas café rojizo.

ALIMENTACIÓN: Se alimentan de insectos que capturan entre el follaje.



TAMAÑO:
13 cm

DATOS CURIOSOS:

Esta reinita es activa en el nivel bajo de la vegetación. Su canto es un crescendo fuerte, alto y resonante.



Parula

TROPICAL

(*Setophaga pitiayumi*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


700 A 1900 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO MONTANO

DESCRIPCIÓN:

Hembra y macho similares, hembra más opaca, su coloración es espectacular debido al contraste entre el amarillo vivo del vientre y gris del dorso. Presenta una máscara negra reducida y el naranja más reducido y claro en la garganta y el pecho.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de insectos, pequeñas arañas y orugas que obtiene de las flores y a veces directamente en vuelo.



TAMAÑO:
11 cm


DATOS CURIOSOS:

Tiene un comportamiento muy inquieto y canta sin descanso, incluso en las horas más calurosas del día.



Matorralero DE GORRO CASTAÑO (*Arremon brunneinucha*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

1300 A 2200 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO MONTANO

DESCRIPCIÓN:

Este matorralero de gorro castaño presenta una máscara negra, nuca de color marrón volviéndose rojizo amarillento en los lados, iris de color café rojizo, pico negro y patas café negruzco. La garganta blanca y presenta una línea negra que bordea la parte superior del pecho.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de frutos y artrópodos. Busca su alimento en el suelo y sotobosque denso.



TAMAÑO:
19 - 20 cm

DATOS CURIOSOS:

Este es otro matorralero distribuido en bosque montano húmedo con abundancia de epífitas a lo largo de la vertiente este de los Andes.



Gorrión

DE COLLAR RUFO
(*Zonotrichia capensis*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

HASTA 4500 m s. n. m.

COSTA

DESCRIPCIÓN:

Este gorrión de collar rufo tiene un cuerpo compacto, patas y pies delgados y un pico fuerte y cónico. Juveniles más rayados pero con collar rufo y misma forma del adulto.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta principalmente de semillas, busca su alimento en el suelo.



TAMAÑO:
14 - 15 cm

DATOS CURIOSOS:

Gorrión común en paisajes abiertos, plantaciones, jardines, patios y cubiertas ajardinadas de edificios.

Matorralero TRICOLOR

(*Atlapetes tricolor*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

1750 A 3050 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO MONTANO

DESCRIPCIÓN:

Presenta los lados de la cabeza negros en contraste con una marcada línea en la coronilla de color amarillo que se extiende hasta la parte alta de la nuca. El iris de sus ojos es café rojizo oscuro, el pico negro y las patas grises.

ALIMENTACIÓN: No existe información acerca de su dieta.



TAMAÑO:
18 cm

DATOS CURIOSOS:


Ambos sexos de esta especie son similares.



Espiguero

DE VIENTRE AMARILLO
(*Sporophila nigricollis*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


600 A 2600 m s. n. m.

PASTIZAL

DESCRIPCIÓN:

El espiguero de vientre amarillo presenta una coloración totalmente marrón o verde olivo en el macho, combinada con la garganta negra y el abdomen claro. La hembra es de color café cálido en gran parte de su cabeza, nuca, manto y baja espalda. Su pico y patas son negruzcas.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta principalmente de semillas de pastos.



TAMAÑO:
11 - 11.5 cm

DATOS CURIOSOS:


Esta especie también suele habitar en zonas perturbadas.



Gorrión

DE CEJA AMARILLA
(*Ammodramus aurifrons*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


HASTA 1800 m s. n. m.

AMAZONÍA

DESCRIPCIÓN:

El adulto de este gorrión es de color gris pardusco con rayas oscuras en la espalda. Tiene el pecho y el vientre grises con la garganta blanquecina. En la cara por encima del ojo tiene una línea de color amarillento característico.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta principalmente de semillas.



TAMAÑO:
13 cm

DATOS CURIOSOS:


Se desplaza a lo largo de ríos, zonas agrícolas, en plazas y jardines, a lo largo de bordes de caminos y en otras áreas abiertas con hierba.



Mielero

COMÚN
(*Coereba flaveola*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

HASTA 1500 m s. n. m.

BORDE DE BOSQUE

DESCRIPCIÓN:

La espalda, las alas y la cola son de color marrón oscuro. El pecho y la rabadilla son amarillos. El vientre es de color amarillo limón. La corona y la cara son de color negro y presenta una evidente banda superciliar blanca. El pico es curvo y puntiagudo con negro y rosado en la base.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta principalmente de néctar y en menor proporción de frutos tipo baya e insectos.



TAMAÑO:
09.5 - 11 cm

DATOS CURIOSOS:

Se le ha visto alimentarse perforando las flores desde la base dejando en duda su rol polinizador.



Semillero PARDO

(*Asemospiza obscura*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


350 A 2100 m s. n. m.

COSTA

DESCRIPCIÓN:

Semillero pardo predominantemente marrón, con un tono más o menos grisáceo en pecho y los costados del cuerpo. Notar la diferencia de tonalidad del pico la parte superior es mas oscura.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de semillas.



TAMAÑO:
11 - 11.5 cm

DATOS CURIOSOS:

Habita en jardines, campos, matorral desértico y bordes de bosque.



Semillero

NEGRO AZULADO

(*Volatinia jacarina*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

HASTA 2400 m s. n. m.

COSTA

DESCRIPCIÓN:

El semillero negro azulado es pequeño, con pico cónico. La costeña muy raras veces de color totalmente negro-azulado. Hembra con pecho finamente rayado; también observar el pico bastante puntiagudo.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de artrópodos y frutos.



TAMAÑO:
10.5 - 11 cm

DATOS CURIOSOS:


Cuando canta lo hace incesantemente seguido de un salto corto.



Tangara

DE PALMERAS
(*Thraupis palmarum*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

HASTA 1600 m s. n. m.

AMAZONÍA

DESCRIPCIÓN:

La tangara de las palmeras se caracteriza por sus colores grises y verdes con tonos alimonados en la cabeza, dependiendo de la luz. Su cola es negruzca, la mitad de sus alas son negras cuando se la ve de perfil.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de frutos, insectos y arañas.



TAMAÑO:
17 - 19 cm

DATOS CURIOSOS:

Generalmente arma sus nidos en cavidades o en la base de hojas de palmas.



Tangara

AZULEJA

(*Thraupis episcopus*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


HASTA 2000 m s. n. m.

LLANURAS

DESCRIPCIÓN:

Ambos sexos son similares y los adultos tienen la cabeza y las partes inferiores del cuerpo color gris azulado claro, las partes dorsales son azules oscuros. Las subespecies de hombro blanco son comunes en la Amazonía.

ALIMENTACIÓN: Su dieta consiste en frutas, que picotea desde las ramas. También captura artrópodos con vuelos cortos.



TAMAÑO:
16 - 18 cm


DATOS CURIOSOS:

Habita en bosques abiertos, áreas cultivadas, jardines y zonas urbanas.

Azulejo

GOLONDRINA
(*Tersina viridis*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


HASTA 1500 m s. n. m.

AMAZONÍA

DESCRIPCIÓN:

El macho es azul brillante, con cara y garganta negra. La hembra y los machos juveniles son verdes. Ambos sexos presentan franjas oscuras en el vientre.

ALIMENTACIÓN: Su dieta se basa en frutos que picotea desde las ramas. También captura artrópodos con vuelos cortos.



TAMAÑO:
15 - 15.5 cm

DATOS CURIOSOS:


El macho tarda varios años en alcanzar su plumaje definitivo.



Tangara

DE CORONA AZAFRÁN
(*Tangara xanthocephala*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

1000 A 2300 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO MONTANO

DESCRIPCIÓN:

Esta Tangara tiene la cabeza principalmente de color amarillo dorado con una pequeña máscara negra que se extiende hasta la garganta. El dorso y las alas son casi completamente azules o verde turquesa con la espalda estriada de negro.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de artrópodos y frutos.



TAMAÑO:
13.5 cm

DATOS CURIOSOS:

También puede ser observada en plantaciones y en bosques perturbados. Busca artrópodos saltando a lo largo de ramas cubiertas de musgo.



Tangara

CARA DE FUEGO
(*Tangara parzudakii*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


1100 A 2500 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO MONTANO

DESCRIPCIÓN:

La tangara cara de fuego es relativamente grande, identificada rápidamente por la cara y la frente de color rojo brillante y la corona, la nuca y los lados del cuello amarillo-dorado.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de artrópodos y frutos. Busca artrópodos saltando a lo largo de ramas cubiertas de musgo.



TAMAÑO:
14 - 14.5 cm

DATOS CURIOSOS:

Su nombre Tangara deriva de la lengua Tupí y significa bailarín. Su epíteto parzudakii se estableció en honor al viajero y colector francés Charles Parzudaki.



Tangara

LENTEJUELA

(*Tangara nigroviridis*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


1500 A 2900 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO MONTANO

DESCRIPCIÓN:

La tangara lentejuela tiene en todo su cuerpo manchas de color azul verdoso brillante, el cual contrasta con la cara y la espalda de color negro. Con una apariencia de varias lentejuelas en el plumaje.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de artrópodos y frutos.



TAMAÑO:
13.5 cm

DATOS CURIOSOS:

Esta Tangara busca artrópodos saltando a lo largo de ramas delgadas y desnudas.

Tangara

DE CABEZA BAYA
(*Tangara gyrola*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

HASTA 1700 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO MONTANO

DESCRIPCIÓN:

Tiene la cabeza rojiza que contrasta con el dorso verde, la garganta, el pecho y el vientre azul turquesa. Presenta una delgada banda nucal amarilla. Hembras y juveniles más opacos que el macho y pueden parecer totalmente verdes.

ALIMENTACIÓN: Su dieta consiste principalmente en frutas, pero con frecuencia comen artrópodos.



TAMAÑO:
13.5 cm

DATOS CURIOSOS:

Esta Tangara busca artrópodos en ramas casi desnudas.



Tangara

DE CUELLO AZUL
(*Stilpnia cyanicollis*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

800 A 2000 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO TROPICAL

DESCRIPCIÓN:

Esta tangara de cuello azul es predominantemente negra con una contrastante capucha azul claro (y delgada máscara negra). Espalda negra, pecho, vientre y en los costados azul intenso dando impresión de negro.

ALIMENTACIÓN: La dieta consiste principalmente en fruta, pero también incluye artrópodos y flores.



TAMAÑO:
13 cm

DATOS CURIOSOS:

Picotea artrópodos en ramas casi desnudas o en las hojas.



Semillero

DE VIENTRE CASTAÑO
(*Sporophila angolensis*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


HASTA 1500 m s. n. m.

AMAZONÍA

DESCRIPCIÓN:

El macho del semillero de vientre castaño tiene la cabeza, el pecho, la espalda, las alas y la cola negros y la parte inferior del pecho, el vientre y la parte inferior de la cola son marrones, pico bastante robusto.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de insectos y semillas.



TAMAÑO:
12.5 cm

DATOS CURIOSOS:

Los semilleros hembra y juveniles tienen todo el plumaje marrón.



Tangara

DE GORRO BLANCO
(*Sericossypha albocristata*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


HASTA 1700 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO MONTANO

DESCRIPCIÓN:

La tangara de gorro blanco tiene la garganta púrpura brillante en los machos y carmesí oscuro en las hembras. Además, presentan una corona blanco nieve. Las alas y la cola son de coloración azul opaco.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de frutos, semillas e insectos.



TAMAÑO:
24 - 26 cm

DATOS CURIOSOS:

Se la encuentra en asociación con la Urraca de Collar Blanco o con caciques.

Saltador

DE GARGANTA ANTEADA
(*Saltator maximus*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

HASTA 1750 m s. n. m.

AMAZONÍA

DESCRIPCIÓN:

Saltador que tiene una hermosa coloración verde que se extiende hasta la cola con la misma coloración. Tiene el costado de la cabeza, el pecho y la parte superior del vientre de color gris, tiene la parte inferior del vientre de color canela, su ceja es corta y gruesa.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta principalmente de frutos, flores, hojas y algunos insectos.



TAMAÑO:
20.5 - 21 cm

DATOS CURIOSOS:


Su nombre científico significa: del (latín) saltador = bailarín; y de maximus = mayor, grande. Gran bailarina o la mayor de las aves danzarinas.



Tangara

DE PICO PLATEADO
(*Ramphocelus carbo*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


HASTA 1800 m s. n. m.

AMAZONÍA

DESCRIPCIÓN:

Tangara de pico plateado con garganta rojo carmesí, pero vistas con poca luz pueden parecer totalmente oscuras. Presentan la base del pico blanco, pareciendo una pieza de porcelana. La hembra es de color marrón opaco con una mandíbula plateada no tan notoria.

ALIMENTACIÓN: Se alimentan principalmente de frutos, complementan su dieta con pequeños insectos como las termitas voladoras y néctar de flores.



TAMAÑO:
18 cm

DATOS CURIOSOS:

Durante los desplazamientos hay centinelas que emite una nota alta, metálica y rápida, para dar aviso en caso de cualquier perturbación.



Tangara

DE PECHO ANTEADO
(*Pipraeidea melanonota*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


1100 A 2900 m s. n. m.

BOSQUE

DESCRIPCIÓN:

El macho de esta tangara tiene una inconfundible coloración azul claro brillante desde la parte superior e inferior de la cabeza. La cara tiene un antifaz negro y una garganta de color más claro que las otras partes inferiores. Ojos café oscuro, pico negro y patas oscuras.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de insectos, semillas y frutos.



TAMAÑO:
14 cm

DATOS CURIOSOS:

Se ha reportado individuos completamente blancos, debido al efecto de leucismo.

Tangara

URRACA

(*Cissopis leverianus*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


HASTA 1600 m s. n. m.

BOSQUE

DESCRIPCIÓN:

La tangara urraca presenta la cabeza, la garganta y el pecho negros azulados brillantes; el vientre y los flancos blancos. Cola larga negra con puntas blancas. Su iris es amarillo.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de insectos, semillas y frutos.



TAMAÑO:
27 cm


DATOS CURIOSOS:

Esta ave de muy llamativos colores se encuentra también se la ha visto en bosque secundario, y en bosques de orillas de ríos.

Tangara

DE MONTAÑA DE ALA AZUL
(*Anisognathus somptuosus*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

1000 A 2200 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO MONTANO

DESCRIPCIÓN:

La tangara de montaña de ala azul presenta en el centro de la corona y nuca color amarillo dorado. La frente, resto de la cabeza, cara y parte superior del dorso negros; hombros azules a púrpuras; alas y cola en la base negras. Garganta, pecho y vientre amarillo intenso.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta principalmente de insectos y también de frutos pequeños y bayas.



TAMAÑO:
18 cm


DATOS CURIOSOS:

Tangara común en el estrato medio, el dosel de bosque y bordes de bosque a lo largo de la vertiente este de los Andes.

Cabezón

BLANCO NEGRO
(*Pachyrhamphus albogriseus*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

1500 A 3200 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO MONTANO

DESCRIPCIÓN:

El macho de este cabezón presenta el gorro negro que contrasta con la espalda gris clara. Hembra identificable por los bordes negros de la corona color rufo-marrón.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de insectos y frutos.



TAMAÑO:
14 cm

DATOS CURIOSOS:

Cabezón poco común en bosques secos y bosques de montaña húmedos subtropicales a lo largo de la vertiente este de los Andes.



Colibrí

VERDE Y BLANCO
(*Elliottomyia viridicauda*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



ENDÉMICA

1000 A 2750 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO

DESCRIPCIÓN:

El colibrí verde y blanco es verde arriba y blanco abajo con verde a los lados del pecho y el vientre.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta del nectar de las flores.



TAMAÑO:
10 - 11 cm

DATOS CURIOSOS:

Se encuentra en poblaciones aparentemente separadas en la ladera este de los Andes.



Colibrí

DE PECHO ZAFIRO
(*Chionomesa lactea*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


HASTA 1400 m s. n. m.

BORDE DE BOSQUE

DESCRIPCIÓN:

La espalda y la nuca de este colibrí de pecho zafiro son de color verde brillante, la cola y parte de las alas son de color azul oscuro, la garganta y parte del pecho son de un azul muy vivo. Garganta violeta y la raya blanca que le baja por el pecho hasta el vientre.

ALIMENTACIÓN: Principalmente la fuente de alimentación son las flores, succionando el néctar que poseen.



TAMAÑO:
09.5 - 10 cm

DATOS CURIOSOS:


Es relativamente frecuente que este colibrí capture pequeños insectos atrapados en las telas de araña.



Estrellita

DE VIENTRE BLANCO
(*Chaetocercus mulsant*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

800 a 3100 m s. n. m.

BORDE DE BOSQUE

DESCRIPCIÓN:

Macho de dorso verde y garganta violeta. Las partes inferiores blancas. La cola es oscura, corta y dividida en dos a manera de tijeras. La hembra es de color verde oscuro por encima y blanca por debajo con los lados del pecho y el vientro rojizos. Ambos tienen una franja desde el ojo al cuello.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta del néctar de flores pequeñas y consume pequeños artrópodos.



TAMAÑO:
07.5 - 08.5 cm

DATOS CURIOSOS:

A esta especie también se le ha visto en zonas semi abiertas y jardines.



Colibrí

DE VIENTRE BLANCO
(*Elliomyia chionogaster*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

1200 A 3500 m s. n. m.

BORDE DE BOSQUE

DESCRIPCIÓN:

Este colibrí de vientre blanco presenta plumaje muy sencillo: verde por encima, blanco por debajo, con puntos verde claro en los lados del pecho. Tiene un pico recto con una base rosada de la mandíbula y puntas blancas en las plumas de la cola.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta del nectar de diversas plantas.



TAMAÑO:
10 - 11 cm


DATOS CURIOSOS:

Su nombre científico significa: de Ellioto = en honor a Daniel Giraud Elliot, y del sufijo griego myia = vuelo y del (griego) khion = nieve; y gastēr = vientre.

Colibrí

DE COLA DE RAQUETA
(*Ocreatus underwoodii*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


1000 A 2400 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO MONTANO

DESCRIPCIÓN:

El macho del colibrí cola de raqueta es fácilmente reconocible por su cola larga de aproximadamente 8cm que termina en forma de raqueta. El cuerpo es principalmente verde brillante, con la garganta y el pecho verde iridiscente.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta principalmente en el dosel, aunque puede posarse en ramas más bajas cuando descansa.



TAMAÑO:
09 - 12 cm

DATOS CURIOSOS:


Etimológicamente la palabra *Ocreatus* hace referencia a las plumas blancas en las patas de este colibrí, y el epíteto *underwoodii* se acuñó en honor al naturalista C. F. Underwood.



Brillante

DE PECHO ANTEADO
(*Heliodoxa rubinoides*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

1500 A 2500 m s. n. m.

SELVA HÚMEDA

DESCRIPCIÓN:

Este colibrí presenta por el vientre color marrón verdoso opaco, con pintas verdes en cantidad variable, y con pequeña gorguera rosada resplandeciente en la parte inferior de la garganta.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta principalmente en los estratos bajo y medio dentro del bosque.



TAMAÑO:
12 - 12.5 cm

DATOS CURIOSOS:

Ambos sexos son similares, aunque la gorguera es bastante reducida en algunas hembras.

Cucarachero COMÚN

(*Troglodytes aedon*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


HASTA 4600 m s. n. m.

VERTIENTE HÚMEDA

DESCRIPCIÓN:

Este cucarachero común es de tamaño pequeño, marrón, con expresiva cola que frecuentemente mantiene levantada. Con barras en alas y cola. Presenta una débil franja por encima del ojo.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta principalmente de artrópodos que se encuentran cerca al suelo como chinches, arañas y escarabajos.



TAMAÑO:
12 - 12.5 cm

DATOS CURIOSOS:

Es una especie frecuentemente parasitada por el tordo parásito.

Mosquero

SOCIAL
(*Myiozetetes similis*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


HASTA 1800 m s. n. m.

AMAZONÍA

DESCRIPCIÓN:

Las líneas oscuras de la cabeza de color gris tiznado (no negro), notar también alas llanas y parche semiescondido en la corona rojo o anaranjada rojiza.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de insectos que captura en el vuelo y también de bayas, semillas y otros frutos.



TAMAÑO:
17 - 17.5 cm


DATOS CURIOSOS:

Su nombre *Myiozetetes* viene de las raíces griegas *muia*= volar y *zeteo*= que busca. El epíteto *similis* proviene del latín y significa similar, semejante, o parecido.

Mosquero

DE CORONA DORADA
(*Myiodynastes chrysocephalus*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


600 A 2700 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO MONTANO

DESCRIPCIÓN:

La coronilla de este mosquero es café grisáceo, tiene un parche dorado en la coronilla usualmente oculto. Encima es de tonalidad café oliva grisáceo, las alas y la cola con prominentes márgenes rufos.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta principalmente de artrópodos, frutas e incluso pequeños vertebrados.



TAMAÑO:
21 cm


DATOS CURIOSOS:

Este mosquero por el vientre es de color amarillo pálido, su pecho y lados marcados con rayas de tono oliva difuso.

Espatulilla COMÚN

(*Todirostrum cinereum*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


600 A 2000 m s. n. m.

BORDE DE BOSQUE

DESCRIPCIÓN:

Espatulilla común con vivo contraste entre el gris azulado oscuro de la cabeza y la parte ventral amarilla. El resto de las partes superiores son en tono verde olivo. Los ojos son de color amarillo dorado. Notable pico largo, plano y oscuro.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de artrópodos como moscas y mariposas.



TAMAÑO:
09.5 cm

DATOS CURIOSOS:

Tiene el comportamiento característico de mover la cola lateralmente.



Tirano

TROPICAL

(*Tyrannus melancholicus*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE

HASTA 2100 m s. n. m.

CAMPO ABIERTO

DESCRIPCIÓN:

Tirano con la cabeza predominantemente gris, con la garganta más clara, con tendencia al blanco y una banda difusa más oscura en la región ocular y auricular. El pecho es verde oliva, destacándose del color amarillo del vientre.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta principalmente de insectos voladores, pero también de artrópodos, frutas e incluso pequeños vertebrados.



TAMAÑO:
22 cm

DATOS CURIOSOS:


Una de las aves más ampliamente distribuidas, comunes y abundantes en Perú, aunque está ausente en los altos Andes y en el Suroeste.



Mosquerito CANELA

(*Pyrrhomyias cinnamomeus*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


900 A 3400 m s. n. m.

SELVA HÚMEDA MONTANA

DESCRIPCIÓN:

Fácilmente reconocible por el tamaño relativamente pequeño, plumaje rufo-marrón y anchas barras alares rufas. La cola, pico y patas son oscuras.

ALIMENTACIÓN: Se alimentan de Insectos y algunas frutas.



TAMAÑO:
13 cm

DATOS CURIOSOS:

Mosquero común en la vertiente este de los Andes y también habita en bordes de bosque.




Mosquero

DE AGUA

(*Sayornis nigricans*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


900 A 3500 m s. n. m.

RÍO

DESCRIPCIÓN:

Este mosquero de agua tiene su cabeza, pecho, partes superiores y alas de color negro hollín, mientras que su abdomen es blanco, como también los bordes de las alas.

ALIMENTACIÓN: Se alimentan principalmente de insectos voladores y otros artrópodos. Algunos individuos también capturan pequeños peces.



TAMAÑO:
17.5 cm

DATOS CURIOSOS:


El nido es una copa semiesférica hecha de barro, pasto, fibras de plantas y algunas veces pelo de animal.

Moscareta

PERUANA

(*Zimmerius viridiflavus*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


HASTA 2600 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO

DESCRIPCIÓN:

Presenta el dorso de color gris oliva y corona oscura. El vientre es por lo general amarillo. Presenta la cara amarilla e iris oscuro.

ALIMENTACIÓN: Como casi todos los mosqueros, suelen alimentarse de moscas principalmente.



TAMAÑO:
11 cm

DATOS CURIOSOS:

Se la ha llegado observar a altitudes de hasta 2600 m s. n. m. los Andes de Piura.

Mosquero

DE VIENTRE AZUFRAO
(*Myiodynastes luteiventris*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



MIGRANTE BOREAL

350 A 1200 m s. n. m.

ÁREA ABIERTA

DESCRIPCIÓN:

Este mosquero tiene el vientre de tonalidad amarillo azufre claro, línea blanquecina encima del ojo, sus bigoterías negras se juntan estrechamente a través de la barbilla.

ALIMENTACIÓN: Atrapa insectos desde una percha expuesta con ágiles movimientos entre el follaje.



TAMAÑO:
21 cm

DATOS CURIOSOS:

Complementa su dieta con bayas y semillas, consumiéndolas casi siempre mientras vuela.




Tirano

DE RISCOS

(*Hirundinea ferruginea*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


400 A 2200 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO MONTANO

DESCRIPCIÓN:

Tirano de riscos de tamaño grande con partes inferiores color rufo intenso y extenso rufo en las alas. Posee un pico más bien largo y ancho en la base, sus alas son largas y como de golondrina.

ALIMENTACIÓN: Se alimentan de Insectos que cazan en el aire haciendo maniobras acrobáticas.



TAMAÑO:
18.5 cm

DATOS CURIOSOS:


Ejecuta largos vuelos siguiendo insectos con un vuelo similar al de las golondrinas.



Mosquero

DE CEJA LIMÓN
(*Conopias cinchoneti*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



MIGRANTE BOREAL


800 A 1950 m s. n. m.

BOSQUE HÚMEDO MONTANO

DESCRIPCIÓN:

El mosquero de ceja limón tiene las partes superiores de color marrón verdoso. Tiene una corona marrón, una línea amarilla ancha por encima del ojo, una máscara marrón a través del ojo y una garganta amarilla.

ALIMENTACIÓN: Se alimentan de Insectos y frutas.



TAMAÑO:
15.5 - 16 cm


DATOS CURIOSOS:

Mosquero presente a lo largo de la vertiente este de los Andes y en aberturas tales como zonas de aludes o claros agrícolas.

Tirano

DE COLA LARGA
(*Colonia colonus*)

RANGO DE DISTRIBUCIÓN



RESIDENTE


HASTA 2300 m s. n. m.

BORDE DE BOSQUE

DESCRIPCIÓN:

El contraste entre el negro del cuerpo y el blanco de la parte superior de la cabeza es exclusivo de este tirano de cola larga. Las dos plumas centrales de la cola son muy largas y destacan por su longitud y ensanchamiento en las puntas.

ALIMENTACIÓN: Se alimentan principalmente de insectos voladores, como las abejas sin aguijón. Los insectos son capturados durante vuelos rápidos.



TAMAÑO:
25 - 26.5 cm

DATOS CURIOSOS:

Se posa en sitios expuestos, tales como árboles muertos o ramas salientes.

Pibi

AHUMADO

(*Contopus fumigatus*)

📍 RANGO DE DISTRIBUCIÓN



🎯 RESIDENTE

🌿 1000 A 2800 m s. n. m.

🌳 SELVA MONTANA ANDINA

👤 DESCRIPCIÓN:

Esta ave es grande, el color es uniformemente gris oscuro y además presenta una cresta. La mandíbula en su mayoría anaranjada.

🍷 **ALIMENTACIÓN:** Se alimenta en áreas semiabiertas y bordes de bosques donde se posa en la punta de ramas expuestas capturando invertebrados.



TAMAÑO:
17 cm

💡 DATOS CURIOSOS:

Usualmente se posa en sitios expuestos, tales como ramas secas en el dosel del bosque o en sus bordes.



Artrópodos: Son el mayor grupo de los animales invertebrados, que no tienen columna vertebral. Se caracterizan por tener patas articuladas y un exoesqueleto que los protege.

Bandadas: Grupo numeroso de aves que vuelan juntas.

Briófitas: División de plantas provistas de unas estructuras parecidas a tallos, hojas y raíces, pero sin vasos; son plantas terrestres, pequeñas y que viven en ambientes húmedos.

Carroña: Carne descompuesta, especialmente la de los animales muertos.

Cecropia: Es un género de árboles con tallos normalmente huecos, habitados por hormigas y que presentan un látex oscuro al secarse.

Dosel: Estrato superior del bosque, continuo debido al entrecruzamiento de las ramas de los árboles que lo conforman.

Endémico : Especie (animal o vegetal) propia y exclusiva de una determinada zona.

Epífita: Epífita o epífita se refiere a cualquier planta que crece sobre otro vegetal u objeto usándolo solamente como soporte, pero que no lo parasita nutricionalmente.

Exoesqueleto: Estructura dura y rígida que recubre exteriormente el cuerpo de los artrópodos y otros invertebrados.

Iridiscente: Fenómeno óptico de ciertas superficies donde el color observado varía de acuerdo al ángulo donde se observa.

Marisma: Son humedales que se forman en la desembocadura de los ríos más importantes, donde reciben el efecto de las mareas, inundándose en mayor o menor medida.

Ave migratoria: Especie que se desplaza regularmente entre zonas separadas, por lo general, debido a cambios estacionales.

Musgo: Los musgos son un tipo de plantas briófitas que viven en condiciones de humedad abundante.

Residente: Que vive en ese lugar desde que nace hasta morir.

Rufa: Rojizo con tonalidades de naranja.

Siringe: Órgano de la voz de la mayoría de las aves.

Sotobosque: Estrato inferior del bosque donde las especies vegetales alcanzan hasta 12 m de altura.

Vertebrados: Comprende a los animales con columna vertebral, compuesta de vértebras.

Xilófago: Que se alimenta de madera.



Índice

• Orden	• Familia	• Nombre científico	• Pág.
Tinamiformes	■ Tinamidae	<i>Tinamus tao</i>	14
Anseriformes	■ Anatidae	<i>Merganetta armata</i>	15
Galliformes	■ Cracidae	<i>Chamaepetes goudotii</i>	16
	■ Cracidae	<i>Ortalis guttata</i>	17
Columbiformes	■ Columbidae	<i>Columba livia</i>	18
	■ Columbidae	<i>Zentrygon frenata</i>	19
	■ Columbidae	<i>Patagioenas fasciata</i>	20
	■ Columbidae	<i>Leptotila verreauxi</i>	21
Cuculiformes	■ Cuculidae	<i>Piaya cayana</i>	22
Suliformes	■ Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	23
Cathartiformes	■ Cathartidae	<i>Cathartes aura</i>	24
Accipitriformes	■ Accipitridae	<i>Elanoides forficatus</i>	25
	■ Accipitridae	<i>Rupornis magnirostris</i>	26
	■ Accipitridae	<i>Buteo platypterus</i>	27
	■ Accipitridae	<i>Buteogallus solitarius</i>	28
Trogoniformes	■ Trogonidae	<i>Pharomachrus auriceps</i>	29
Coraciiformes	■ Momotidae	<i>Momotus aequatorialis</i>	30
Galbuliformes	■ Bucconidae	<i>Malacoptila fulvogularis</i>	31
Piciformes	■ Picidae	<i>Dryobates fumigatus</i>	32
	■ Picidae	<i>Campephilus haematogaster</i>	33
	■ Picidae	<i>Picumnus lafresnayi</i>	34
	■ Picidae	<i>Dryocopus lineatus</i>	35
	■ Ramphastidae	<i>Aulacorhynchus albivitta</i>	36
	■ Ramphastidae	<i>Aulacorhynchus coeruleicinctis</i>	37
Passeriformes	■ Cardinalidae	<i>Pheucticus chrysogaster</i>	38
	■ Cardinalidae	<i>Piranga flava</i>	39
	■ Cinclidae	<i>Cinclus leucocephalus</i>	40
	■ Corvidae	<i>Cyanocorax violaceus</i>	41
	■ Corvidae	<i>Cyanocorax yncas</i>	42
	■ Cotingidae	<i>Rupicola peruvianus</i>	43
	■ Donacobiidae	<i>Donacobius atricapilla</i>	44
	■ Fringillidae	<i>Spinus magellanicus</i>	45
	■ Furnariidae	<i>Synallaxis azarae</i>	46
	■ Furnariidae	<i>Sittasomus griseicapillus</i>	47
	■ Furnariidae	<i>Philydor erythrocercum</i>	48
	■ Furnariidae	<i>Xenops rutilans</i>	49
	■ Furnariidae	<i>Premnoplex brunnescens</i>	50
	■ Icteridae	<i>Psarocolius atrovirens</i>	51
	■ Icteridae	<i>Psarocolius angustifrons</i>	52



● Orden	● Familia	● Nombre científico	● Pág.
Passeriformes	■ Parulidae	<i>Myioborus miniatus</i>	53
	■ Parulidae	<i>Cardellina canadensis</i>	54
	■ Parulidae	<i>Basileuterus tristriatus</i>	55
	■ Parulidae	<i>Setophaga pitaiayumi</i>	56
	■ Passerellidae	<i>Arremon brunneinucha</i>	57
	■ Passerellidae	<i>Zonotrichia capensis</i>	58
	■ Passerellidae	<i>Atlapetes tricolor</i>	59
	■ Thraupidae	<i>Sporophila nigricollis</i>	60
	■ Thraupidae	<i>Ammodramus aurifrons</i>	61
	■ Thraupidae	<i>Coereba flaveola</i>	62
	■ Thraupidae	<i>Asemospiza obscura</i>	63
	■ Thraupidae	<i>Volatinia jacarina</i>	64
	■ Thraupidae	<i>Thraupis palmarum</i>	65
	■ Thraupidae	<i>Thraupis episcopus</i>	66
	■ Thraupidae	<i>Tersina viridis</i>	67
	■ Thraupidae	<i>Tangara xanthocephala</i>	68
	■ Thraupidae	<i>Tangara parzudakii</i>	69
	■ Thraupidae	<i>Tangara nigroviridis</i>	70
	■ Thraupidae	<i>Tangara gyrola</i>	71
	■ Thraupidae	<i>Stilpnia cyanicollis</i>	72
	■ Thraupidae	<i>Sporophila angolensis</i>	73
	■ Thraupidae	<i>Sericossypha albocristata</i>	74
	■ Thraupidae	<i>Saltator maximus</i>	75
	■ Thraupidae	<i>Ramphocelus carbo</i>	76
	■ Thraupidae	<i>Pipraeidea melanonota</i>	77
	■ Thraupidae	<i>Cissopis leverianus</i>	78
	■ Thraupidae	<i>Anisognathus somptuosus</i>	79
	■ Tityridae	<i>Pachyrhamphus albogriseus</i>	80
	■ Trochilidae	<i>Elliotomyia viridicauda</i>	81
	■ Trochilidae	<i>Chionomesa lactea</i>	82
	■ Trochilidae	<i>Chaetocercus mulsant</i>	83
	■ Trochilidae	<i>Elliotomyia chionogaster</i>	84
	■ Trochilidae	<i>Ocreatus underwoodii</i>	85
	■ Trochilidae	<i>Heliodoxa rubinoides</i>	86
	■ Troglodytidae	<i>Troglodytes aedon</i>	87
	■ Tyrannidae	<i>Myiozetetes similis</i>	88
	■ Tyrannidae	<i>Myiodynastes chrysocephalus</i>	89
	■ Tyrannidae	<i>Todirostrum cinereum</i>	90
	■ Tyrannidae	<i>Tyrannus melancholicus</i>	91
	■ Tyrannidae	<i>Pyrrhomyias cinnamomeus</i>	92
	■ Tyrannidae	<i>Sayornis nigricans</i>	93
	■ Tyrannidae	<i>Zimmerius viridiflavus</i>	94
	■ Tyrannidae	<i>Myiodynastes luteiventris</i>	95
	■ Tyrannidae	<i>Hirundinea ferruginea</i>	96
	■ Tyrannidae	<i>Conopias cinchoneti</i>	97
	■ Tyrannidae	<i>Colonia colonus</i>	98
	■ Tyrannidae	<i>Contopus fumigatus</i>	99



Checklist



Ammodramus aurifrons



Anisognathus somptuosus



Arremon brunneinucha



Asemospiza obscura



Atlapetes tricolor



Aulacorhynchus albivitta



Aulacorhynchus coeruleinctis



Basileuterus tristriatus



Buteo platypterus



Buteogallus solitarius



Campephilus haematogaster



Cardellina canadensis



Cathartes aura



Chaetocercus mulsant



Chamaepetes goudotii



Chionomesa lactea



Cinclus leucocephalus



Cissopis leverianus



Coereba flaveola



Colonia colonus



Columba livia



Conopias cinchoneti



Contopus fumigatus



Cyanocorax violaceus



Cyanocorax yncas



Donacobius atricapilla



Dryobates fumigatus



Dryocopus lineatus



Elanoides forficatus



Elliotomyia chionogaster



Elliotomyia viridicauda



Heliodoxa rubinoides



Hirundinea ferruginea



Leptotila verreauxi



Malacoptila fulvogularis



Merganetta armata



Momotus aequatorialis



Myioborus miniatus



Myiodynastes chrysocephalus



Myiodynastes luteiventris



Myiozetetes similis



Ocreatus underwoodii



Ortalis guttata



Pachyramphus albogriseus



Checklist



Patagioenas fasciata



Phalacrocorax brasilianus



Pharomachrus auriceps



Pheucticus chrysogaster



Philydor erythrocerum



Piaya cayana



Picumnus lafresnayi



Pipraeidea melanonota



Piranga flava



Premnoplex brunnescens



Psarocolius angustifrons



Psarocolius atrovirens



Pyrrhomyias cinnamomeus



Ramphocelus carbo



Rupicola peruvianus



Rupornis magnirostris



Saltator maximus



Sayornis nigricans



Sericossypha albocristata



Setophaga pitiauyumi



Sittasomus griseicapillus



Spinus magellanicus



Sporophila angolensis



Sporophila nigricollis



Stilpnia cyanicollis



Synallaxis azarae



Tangara gyrola



Tangara nigroviridis



Tangara parzudakii



Tangara xanthocephala



Tersina viridis



Thraupis episcopus



Thraupis palmarum



Tinamus tao



Todirostrum cinereum



Troglodytes aedon



Tyrannus melancholicus



Volatinia jacarina



Xenops rutilans



Zentrygon frenata



Zimmerius viridiflavus



Zonotrichia capensis



Blibiografía

- Begazo, A. Perú aves. CORBIDI, Lima, Perú. Disponible en <https://www.perua-ves.org/> .Revisado el 20 de Abril del 2022
- EBird. 2021. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. Disponible: <http://www.ebird.org>. Revisado el 11 de Marzo del 2022
- EcuRed. Aves de Cuba. Disponible en https://www.ecured.cu/index.php?title=Tinamus_tao&oldid=2996977. Revisado el 20 de Abril del 2022
- Lane, Daniel, Douglas Stotz, John O'Neill, Theodore Parker III y Thomas Schulenberg. 2010 Aves de Perú. Lima, Peru: Centro de Ornitología y Biodiversidad.
- Naturalista, 2021. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Disponible en <http://www.naturalista.mx>. Revisado el 20 de Abril del 2022
- Olmedo, I & Arzuza, D Freile, J. F., Poveda, C. 2019. Aves del Ecuador. Version 2019.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. <https://bioweb.bio/faunaweb/avesweb/FichaEspecie/Malacoptila%20fulvogularis>. Revisado el 20 de Abril del 2022
- Plenge, M. A. 2010. List of the Birds of Peru. Perú: Sernanp.
- Schulenberg, Thomas S., Stotz, Douglas F., Lane, Daniel F., O'Neill, John P. and Parker, Theodore A..2010 Birds of Peru: Revised and Updated Edition, Princeton: Princeton University Press,. <https://doi.org/10.1515/9781400834495>
- Universidad de Icesi. Wiki aves de Colombia, Cali, Colombia. Disponible en https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php. Revisado el 20 de Abril del 2022
- WikiAves, 2022. WikiAves, la Enciclopedia de las Aves de Brasil. Disponible en: <http://www.wikiaves.com.br/> . Revisado el 14 de Abril del 2022



Buenas prácticas para la observación de las aves

En esta sección brindaremos algunas recomendaciones para desarrollar una correcta observación de aves:

1 Hacer el mínimo ruido posible para no ahuyentar a las aves.
No acercarnos a los nidos que observemos o encontremos.

2 Tratar de conservar la distancia y no hacer movimientos bruscos.
No lanzar objetos para hacer que se muevan las aves.

3 No dejar ningún residuo al lugar donde se visita.
No pretender dejar alimento de cualquier tipo para atraer la atención de las aves.

4 Procurar llevar ropa que se camufla en el ambiente (verde, crema u otros).

ANEXO



Foto: Jessica Contreras





El presente libro “Guía de Aves de Marancocha
Concepción-Perú” ha sido elaborado en el marco del
convenio interinstitucional entre el SERFOR, la ATFFS
Sierra Central y Yunkawasi.



RAINFOREST
TRUST

